

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative
67084 STRASBOURG Cedex

ALSACE ET LORRAINE

Bas-Rhin, Haut-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges

BULLETIN TECHNIQUE n° 53

Le 30 août 1983

"Grandes Cultures" envoi n° 29



Alsace : (88) 61.49.50 poste 453
Lorraine : (8) 337.26.45

POMME-DE-TERRE

MIL DIOU

Les conditions climatiques restent actuellement peu favorables au développement du mildiou. Cependant, les rosées matinales fréquentes peuvent être à l'origine de nouvelles contaminations sur les variétés tardives, ainsi que sur les cultures d'altitude.

Dans ces cas, le renouvellement du traitement fongicide est conseillé.

CULTURES MARAICHERES ET LEGUMIERES DE PLEIN CHAMP

- Poireau -

TEIGNE

Le vol des papillons de la 3ème génération se poursuit. Une nouvelle protection insecticide doit être effectuée dans les meilleurs délais. Des attaques graves sont observées dans les parcelles non protégées.

Ce traitement sera efficace pour lutter contre les thrips.

- C h o u -

PIERIDE

Les vols de piérides, souvent importants, apparus au cours de la semaine dernière, se poursuivent. Les premières colonies de chenilles sont observées.

Surveiller attentivement les cultures afin de prévoir un traitement si nécessaire.

Utiliser l'un des produits suivants (g m.a./hl) : [Bacillus thuringiensis (dose selon spécialité) ; cyperméthrine (3) ; deltaméthrine (0,75) ; méthomyl (40)]

- Céleri -

SEPTORIOSE

La septoriose marque une nette progression sur variétés sensibles. La protection doit être maintenue.

- Tomate de plein air -

MIL DIOU - ALTERNARIA

L'état sanitaire des tomates de plein air est généralement satisfaisant.

Néanmoins, un traitement préventif est à prévoir au cours de ces prochains jours.

P52